

EXTENSION DEL RANGO MERIDIONAL DE LA RARA (*PHYTOTOMA RARA* MOL.)  
HASTA MAGALLANES \*  
(AVES: PHYTOTOMIDAE)

CLAUDIO VENEGAS C. \*\*

SUMARIO

Se comunica el hallazgo de la Rara (*Phytotoma rara* Mol.) en el Parque Nacional "Torres del Paine" (51° S; 73° W) y su vecindad, Magallanes (Chile), extendiéndose así su distribución sur desde Aisén hasta Magallanes.

ABSTRACT

The Rufous-Tailed Plantcutter (*Phytotoma rara* Mol.) is reported in Torres del Paine National Park (51° S; 73° W) and its vicinity, Magallanes (Chile), extending its south distribution from Aisen to Magallanes.

La *Phytotoma rara* Molina, conocida vernacularmente como "rara" o "cortarramas", presentaba hasta ahora un rango distribucional desde Atacama (Vallenar) hasta Aisén en Chile y con una extensión a los sectores occidentales de Neuquén y Río Negro (Olrog, 1963; Johnson y Goodall, 1967; Meyer de Schauensee, 1971). Philippi-B. (1964), la incluye además en Chubut (Rep. Argentina) y Woods (1975) la considera como accidental en las islas Malvinas, según un registro de marzo de 1937 en Douglas Station.

En Magallanes, específicamente en la provincia de Última Esperanza, existía ya desde la primavera de 1975 la presunción de la presencia de esta especie por parte del autor, sobre la base de la audición aislada, pero imprecisa, del extraño "canto" del ave. Sin embargo su presencia no fue suficientemente evidenciable en dicha oportunidad.

Recién en febrero de 1977 fueron observados los primeros ejemplares para el sector de Puesto Toro (Lago del Toro), en

las inmediaciones de la localidad de Cerro Castillo (51° 15' S aprox.), con el registro de dos ejemplares por parte del señor Roberto Livingston. A fines del mismo año, el 1° de noviembre, el señor Hans Roehrs, prestigiado observador de aves y miembro del Club de Pesca y Caza de Punta Arenas, observó un ejemplar a 4 km de la entrada principal del Parque Nacional "Torres del Paine" y otro en el interior del parque. Posteriormente, el día 11 de diciembre, el mismo informante observó y fotografió otros dos ejemplares de rara en el camino hacia el paso fronterizo Baqueano Zamora, en el sector de Laguna Azul (comprendida también en el P/N "Torres del Paine", en un área dominada vegetacionalmente por mata negra (*Verbena tridens*) y calafate (*Berberis buxifolia*).

\* Aceptado para su publicación en diciembre de 1977. Corresponde al proyecto "Determinación de las regiones bioecológicas de Magallanes".

\*\* Sección Zoología, Departamento de Recursos Naturales Terrestres.

La Rara es un Passeriforme que presenta dimorfismo sexual; pero en general ambos sexos son de estructura voluminosa o gruesa, con forma de un fringilo grande (aproximadamente 20 cm. de longitud total); pico cónico y grueso con bordes aserrados o "dentados"; alas y piernas cortas y cola relativamente larga.

El macho adulto presenta la frente y corona de color castaño; lados de la cabeza negros con manchas auriculares y mostachales blancas; superficie dorsal, incluidos los lados del cuello, de color pardo oliváceo densamente estriado de negro; rémiges negras, las primarias externas con borde blanco apicalmente, las secundarias con borde acanelado; cobertoras medias y mayores con sendas bandas blancas; rectrices centrales pardo negruzcas; el resto con vano externo y ancha banda terminal negra; los vanos internos en su porción proximal de color castaño. Superficie ventral de color ladrillo, con estrias negras en los flancos.

La hembra adulta presenta la superficie dorsal pardo terrosa, estriada de negro; frente levemente acanelada. Superficie ventral de color ante estriado de negro en general, excepto la garganta. Las bandas alares son de color ante y la cola es similar a la del macho.

Los ambientes típicos de esta especie son los claros de bosque, matorrales, huertos y campos cultivados. Se alimenta de brotes, hojas nuevas y frutos, los que cor-

ta con sus poderosas mandíbulas finamente aserradas y de ahí su nombre genérico *Phytotoma* (Cortaplantas). En Chile es el único representante de la familia monogénica Phytotomidae, que consta de otras dos especies: *Ph. rutila* o cortarramas chico (con dos subespecies) y *Ph. raimondii* o cortarramas peruano, todas exclusivamente sudamericanas.

En Magallanes *Phytotoma rara* tendría calidad de visitante de verano para el área de Ultima Esperanza, faltando calificar su status reproductivo. Sin embargo y a juzgar por la época en que ha sido avistada debiera tratarse de un visitante que nidifica.

#### LITERATURA CITADA

- JOHNSON, A. W. y J. D. GOODALL, 1967. *The Birds of Chile and Adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru*. Platt Estab. Graf. Buenos Aires. Vol. 2: 289-291.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R., 1971. *A Guide to The Birds of South America*. Oliver & Boyd, Edinburgh. 470 p.
- OLROG, C. C., 1963. *Lista y Distribución de las Aves Argentinas*. Univ. Nac. de Tucumán, Opera Lilloana 9: 273-274.
- PHILIPPI-B., R. A., 1964. Catálogo de las Aves de Chile con su distribución geográfica. *Inv. Zool. Chilenas*. Vol. 11: 150 p.
- WOODS, R. W., 1975. *The Birds of the Falkland Islands*. The Compton Press Ltd. Great Britain. 230 p.